EN: ACID CONCENTRATE FOR HEMODIALYSIS

Important: Store at a temperature no lower than 4°C. Pyrogen-free product. Single use only.
Intended purpose: Preparation of dialysis fluid used in hemodialysis and related therapies.
Indication: Treatment of patients with acute or chronic renal failure when hemodialysis is prescribed by a physician. **Clinical Benefits:** Facilitate the clearance of blood from uremic toxins that are able to pass through the dialysis membrane and balance out the electrolyte disbalance. **Contraindication:** There are no special contraindications for the use of Nipro-sol Citrasate. Patients who are hypersensitive to any components used in the Nipro-sol Citrasate should not be dialyzed with this product. **Side-effects:** There are no side-effects reported for Nipro-sol Citrasate. **Instructions:** Dilute with water for dialysis and mix well to seed in combination with powder bicarbonate concentrate and hemodialysis machines. To be connected to the acid concentrate connector, as per the machine manufacturer's instructions. Dilution is based on the following proportion: See the product label; B is the bicarbonate concentrate and H20 is deionized water, complying with EP, ISO 23500-5, and applicable to local quality requirements. **Warning:** To be used by qualified professionals. Non-sterile solutions are excluded. To be used under the physician's order. Ensure that the composition corresponds to the physician's prescription. Do not use if the package is damaged. The concentrated solution must be diluted immediately before use. Any quantity of unused solution must be discarded as neither its properties nor its final mixture concentration can be guaranteed, and therefore the best treatment for the patient cannot be assured. See table below for an indication of hemodialysis minutes for standard dialysis fluid flows according to the container volume. See table below for an indication of expected dialysis fluid volume obtained from each container volume. Do not use after the expiry date stated on the package. Citrate, a component of this product, may reduce the need for heparin and may lower glucose and Mg concentrations. Any serious incident that has occurred in relation to the product should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is based. Dispose of the product according to local and national regulations.

ES: CONCENTRAT KISELINE ZA HEMODIJALIZU

Važno: Skladištiti na temperaturi iznad +4 °C. Ne sadrži pirogen. Za jednokratnu uporabu.
Namjena: Priprema tekućih i dijaliznih kupelji za hemodijalizu i slične terapije.
Indikacija: Liječenje pacijenata s akutnim ili kroničnim zatajenjem bubrega kada je hemodijaliza propisao liječnik. **Klinički koristi:** Olakšavanje čišćenja krvi od uremičkih toksina koji mogu proći kroz dijaliznu membranu i postizanje ponovne ravnoteže kod disbalansa elektrolita. **Kontraindikacija:** Ne postoje posebne kontraindikacije za primjenu proizvoda Nipro-sol Citrasate. Pacijenti koji su preosjetljivi na bilo koju komponentu korištenu u proizvodu Nipro-sol Citrasate ne smije se dializirati ovim proizvodom. **Nuspojave:** Nema prijavljenih nuspojava za Nipro-sol Citrasate **Uputstva:** Kiselinski koncentrat razrijeđen u omjeru 1:44 se treba koristiti u kombinaciji s koncentratom bikarbonata u prahu i u aparatima za hemodijalizu. Povezati na priključak kiselinskog koncentrata, u skladu s uputama proizvođača aparata. Razrjeđivanje se bazira na sljedećem omjeru: Pogledajte naljepnicu proizvoda; B je koncentrat bikarbonata, a H20 je dejonizirana voda koja ispunjava standarde EP i ISO 23500-5 te primjenjive lokalne zahtjeve u pogledu kvaliteta. **Upozorenja:** Za upotrebu od strane zdravstvenih radnika. Kučna dijaliza je isključena. Koristiti po nalogu ljekara. Provjerite da li sastav odgovara ljekarskom recepta. Ne koristiti ako je pakovanje oštećeno. Koncentrirana otopina mora se razrijediti neposredno prije upotrebe. Sva neiskorištena količina otopine mora se baciti jer nije moguće garantovati niti jedno njeno svojstvo niti sastav konačne mješavine. Prema tome, najbolja terapija za pacijenta ne može biti zagarantovana. Pogledajte tablelu u nastavku za prikaz trajanja hemodijalize u minutama za standardne protoke tečnosti za dijalizu prema raspoloživoj zapremini proizvoda. Pogledajte tablelu u nastavku za prikaz očekivane zapremine tečnosti za dijalizu na osnovu zapremine svakog spremnika. Nemojte koristiti nakon isteka roka navedenog na pakovanju. Citrat, koji je sastavni dio ovog proizvoda, može smanjiti potrebu za heparinom i može smanjiti koncentraciju Ca i Mg u plazmi. Svaki ozbiljni incident koji se dogodi u vezi s proizvodom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu zemlje članice u kojoj korisnik ili pacijent ima prebivalište. Proizvod odložite u skladu s lokalnim i državnim regulativama.

DE: CITRONENSÄURE FÜR HÄMODIALYSE

Wichtig: Bei einer Temperatur von mindestens 4 °C aufbewahren. Pyrogenfreies Produkt. Nur zum Einmalgebrauch. **Verwendungszweck:** Vorbereitung der bei Hämodialyse und ähnlichen Therapien verwendeten Dialysflüssigkeit. **Anwendungsgebiete:** Behandlung von Patienten mit akuter oder chronischer Niereninsuffizienz, denen eine Hämodialyse ärztlich verordnet wurde. **Klinischer Nutzen:** Unterstützt die Entfernung von Urämiegiften aus dem Blut, die durch die Dialysiermembran gelangen, und gleicht Störungen des Elektrolythaushalts aus. **Gegenanzeigen:** Für die Anwendung von Citrasate gibt es keine besonderen Gegenanzeigen. Patienten, die überempfindlich auf in Nipro-sol Citrasate verwendete Bestandteile reagieren, dürfen nicht mit diesem Produkt dialysiert werden. **Nebenwirkungen:** Für Nipro-sol Citrasate sind keine Nebenwirkungen bekannt. **Gebrauchsanweisung:** Das Säurekonzentrat ist im Verhältnis 1:44 zu verdünnen und zusammen mit Bicarbonatkonzentratpulver und Hämodialysegeräten anzuwenden. Zum Anschluss an den Säurekonzentratanschluss gemäß den Anweisungen des Geräteherstellers. Verdünnungsverhältnis: Siehe Produktetikett. B ist das Bicarbonatkonzentrat und H20 ist entionisiertes Wasser, das EP, ISO 23500-5 und den geltenden lokalen Qualitätsanforderungen entspricht. **Warnhinweise:** Zur Anwendung durch medizinische Fachkräfte. Heimdialyse ist ausgeschlossen. Unter Ärztlicher Anweisung zu verwenden. Die Zusammensetzung muss mit der Behandlungsvorschrift des Arztes übereinstimmen. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Die konzentrierte Lösung muss unmittelbar vor dem Gebrauch verdünnt werden. Nicht verwendete Lösungsreste müssen entsorgt werden, da für sie weder die Produkteigenschaften noch die endgültige Zusammensetzung der Mischung gewährleistet werden kann, sodass eine optimale Behandlung für den Patienten nicht sichergestellt werden kann. Siehe nachfolgende Tabelle mit Angaben zur Hämodialysedauer in Minuten für Standardflussraten der Dialysflüssigkeit entsprechend dem Behältervolumen. Siehe nachfolgende Tabelle mit Angaben zum erwarteten Dialysierflüssigkeitsvolumen, das aus jedem Behältervolumen gewonnen wird. Nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Citrat, ein Bestandteil dieses Produkts, kann den Bedarf an Heparin verringern und die Ca- und Mg-Konzentrationen im Plasma senken. Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der in Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender bzw. Patient ansässig ist, gemeldet werden. Die Entsorgung des Produkts muss gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften erfolgen.

ES: ÁCIDO CONCENTRADO PARA HEMODIÁLISIS

Importante: Conservar a temperatura no inferior a 4°C. Producto apirógeno de un solo uso.
Propósito: Preparación del líquido de diálisis utilizado en hemodiálisis y terapias relacionadas.
Indicaciones: Para el tratamiento de las insuficiencias renal aguda o crónica la hemodiálisis es prescrita por un médico. **Beneficios clínicos:** Facilitar la eliminación de la sangre de las toxinas úricemicas que pueden pasar a través de la membrana de diálisis y equilibrar el desequilibrio electrolítico. **Contraindicaciones:** No existen contraindicaciones especiales para el uso de Nipro-sol Citrasate. Los pacientes hipersensibles a cualquier componente usado en Nipro-sol Citrasate no deberían realizar la diálisis con este producto. **Efectos secundarios:** No existen efectos secundarios para Nipro-sol Citrasate. **Instrucciones:** Para utilizarse en monitores de hemodiálisis para bicarbonato sólido en polvo en dilución 1:44. Utilícese con conectores de ácido. Conectar según las instrucciones del fabricante del aparato. Para los monitores de hemodiálisis. Diluir en la proporción: Ver etiqueta de producto; siendo B concentrado de bicarbonato y H20 agua desionizada, cumpliendo con EP, ISO 23500-5, apropiadas según regulaciones locales de aplicación. **Advertencias:** Para ser utilizado por profesionales de la salud. Excluida la diálisis en casa. Para ser utilizado bajo la orden del médico. Asegúrese de que la composición corresponda a la prescripción del médico. No utilizar si el envase está dañado. La solución concentrada debe diluirse inmediatamente antes de su uso. La cantidad de concentrado no utilizada debe desecharse. En caso contrario, no se pueden garantizar las propiedades del producto ni la composición final de la mezcla, por lo tanto, no se puede asegurar un tratamiento óptimo del paciente. Ver tabla adjunta de volumen de líquido de diálisis habituales o obtenes según volumen del envase. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. El citrato, un componente de este producto, puede reducir la necesidad de heparina y puede reducir las concentraciones plasmáticas de Ca y Mg. Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro donde el usuario y/o el usuario o el paciente. Deseche el producto de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.

FR: CONCENTRÉ ACIDE POUR HÉMODIALYSE

Important : Ne pas conserver à une température inférieure à 4 °C. Produit apyrogène. Produit à usage unique. **Utilisation prévue :** Produit destiné à la préparation du dialysat utilisé en hémodialyse et dans les thérapies apparentées. **Indication:** Traitement des patients présentant une insuffisance rénale aiguë ou chronique lorsqu'une hémodialyse a été prescrite par un médecin. **Bénéfices cliniques:** Faciliter l'élimination du sang des toxines urémiques capables de traverser la membrane de dialyse et corriger le déséquilibre électrolytique. **Contre-indications :** Il n'existe aucune contre-indication particulière à l'utilisation de Nipro-sol Citrasate. Les patients hypersensibles à l'un des composants utilisés dans Nipro-sol Citrasate ne peuvent pas être dialysés avec ce produit. **Effets indésirables :** Aucun effet indésirable n'a été signalé avec Nipro-sol Citrasate. **Instructions :** Le concentré acide dilué à 1:44 doit être utilisé conjointement avec le concentré bicarbonate (poudre) et un générateur d'hémodialyse. Il doit être raccordé au connecteur de concentré acide conformément aux instructions du fabricant de l'appareil. Dilution dans les proportions suivantes : Voir l'étiquette du produit ; B correspond au concentré bicarbonate et H20 à l'eau déionisée, conformes à la pharmacopée européenne et à la norme ISO 23500-5 et aux exigences de qualité locales. **Avertissements :** Produit destiné à être utilisé par des professionnels de santé. Ne convient pas pour la dialyse à domicile. Uniquement sur prescription médicale. Vérifier que la composition correspond à la prescription du médecin. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. La solution concentrée doit être diluée juste avant emploi. Tout volume de solution non utilisé doit être jeté, car ni les propriétés, ni la composition finale du mélange ne peuvent être garanties. Il est dès lors impossible de garantir que le patient reçoive le meilleur traitement. Consulter le tableau ci-dessous pour une estimation du temps d'hémodialyse (en minutes) pour une dialyse à un débit standard en fonction du volume du liquide. Consulter le tableau ci-dessous pour une estimation du volume de dialysat attendu pour chaque volume de bidon. Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l'emballage. Le citrate présent dans le produit peut réduire le besoin d'héparine et diminuer les concentrations plasmatiques de Ca et de Mg. Tout incident majeur survenu en lien avec le produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre de résidence de l'utilisateur et/ou du patient. Éliminer le produit conformément aux réglementations nationales et locales en vigueur.

HU: KIELNI KONCENTRAT ZA HEMODIJALIZU

Važno: Čuvati na temperaturi ne niže od 4 °C. Apirogeno. Samo za jednokratnu uporabu.
Namjena: Pri pripremi dijaliznog tekućine za primjenu u hemodijalizi i srodnim terapijama.
Indikacija: Liječenje bolesnika s akutnim ili kroničnim zatajenjem bubrega kada liječnik odredi hemodijalizu. **Klinička dobrobiti:** Olakšava odstranjivanje uremičnih toksina iz krvi koji prolaze dijaliznačkim membranu i poravnava neravnotežu elektrolita. **Kontraindikacije:** Nema posebnih kontraindikacija za uporabu koncentrata Nipro-sol Citrasate. Bolesnici koji su preosjetljivi na bilo koji od sastojaka koncentrata Nipro-sol Citrasate ne smije se dializirati ovim proizvodom. **Nuspojave:** Nema nuspojava prijavljenih za Nipro-sol Citrasate. **Upute:** Kiseli koncentrat s razrjeđenjem 1:44 primjenjuje se s koncentratom bikarbonata u prahu i u aparatima za hemodijalizu. Potrebno je da se spoji na konektor za kiseli koncentrat sukladno uputama proizvođača aparata. Razrjeđivanje se temelji na sljedećem omjeru: Pogledajte deklaraciju proizvoda; B je koncentrat bikarbonata a H20 je deionizirana voda, sukladna EP i ISO 23500-5 te primjenjivo na lokalne zahtjeve za kvalitetu. **Upozorenje:** Upotrebljavati samo zdravstveni radnici. Dijaliza kod kuće je isključena. Za primjenu samo po određenj lječnika. Provjerite da sastav odgovara ljekarskom receptu. Ne koristiti ako je pakovanje oštećeno. Koncentrirana otopina mora se razrijediti neposredno prije uporabe. Bilo koja količina neupotrebljene koncentrirane otopine mora se baciti jer se ne mogu zajamčiti svojstva sastava konačne mješavine te se stoga ne može osigurati najbolja terapija. Indikativna tablica trajanja hemodijalize u minutama u standardne protoke dijaliznačra prema volumenu spremnika. Pogledajte tablicu u nastavku za indikaciju očekivanog volumena tekućine koji se dobije iz svakog volumena spremnika. Ne upotrijebiti nakon isteka datuma roka valjanosti navedenog na pakiranju. Citrat, sastojak ovog proizvoda, može smanjiti potrebu za heparinom i smanjiti koncentracije kalcija i magnezija u plazmi. Svaki ozbiljni incident koji se dogodi u vezi s proizvodom mora se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu zemlje članice u kojem korisnik ili pacijent prebiva. Zbrinite u skladu s lokalnim i nacionalnim propisima.

NL: ZUURCONCENTRAAT VOOR HEMODIALYSE

Belangrijk: Bewaren bij een temperatuur van ten minste 4°C. Pyrogeenvrij product. Uitsluitend voor eenmalig gebruik. **Beoogd doel:** Bereiding van dialysaat voor gebruik bij hemodialyse en aanverwante therapieën. **Indicatie:** Voor de behandeling van patiënten met acute of chronische nierfalen wanneer hemodialyse door een arts wordt voorgeschreven. **Klinische voordelen:** Bevordert de klaring van bloed door dit te zuiveren van uremische toxinen die het dialysemembraan kunnen doordringen, en draagt zo bij tot het herstel van het elektrolytenevenwicht. **Contra-indicatie:** Er zijn geen speciale contra-indicaties voor het gebruik van Nipro-sol Citrasate. Patiënten die overgevoelig zijn voor enig ander bestanddeel van Nipro-sol Citrasate mogen niet worden gedialyseerd met dit product. **Bijwerkingen:** Er werden geen bijwerkingen gemeld voor Nipro-sol Citrasate. **Instructies:** Dit zuurconcentraat dient te worden gebruikt in hemodialysemachines voor de verdunning van geconcentreerd bicarbonaatpoeder in een verhouding van 1:44. Gebruik het met de zuurconcentraatkoppeling van de machine volgens de instructies van de fabrikant van de hemodialysemachine. De verdunning is gebaseerd op de volgende verhouding: Zie het productetiket; B is het bicarbonaatconcentraat en H20 is gedeïoniseerd water, in overeenstemming met EP, ISO 23500-5 en toepasselijke lokale kwaliteitseisen. **Waarschuwingen:** Alleen te gebruiken door zorgprofessionals. Niet geschikt voor thuisdialyse. Te gebruiken volgens de instructies van de arts. De samenstelling moet overeenstemmen met het voorschrift van de arts. Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. De geconcentreerde oplossing moet onmiddellijk vóór gebruik worden verdund. Ongebruikt concentraat moet worden weggegooid. Zo niet, kunnen noch de eigenschappen van het product, noch de uiteindelijke samenstelling van de gemengde oplossing worden gegarandeerd en zal er dan geen optimale behandeling van de patiënt kunnen worden verzekerd dat de patiënt de juiste behandeling krijgt. Raadpleeg de onderstaande tabel voor een indicatie van de hemodialyseduur (minuten) voor standaard dialysaatflows overeenkomstig het volume van de container. Raadpleeg de onderstaande tabel voor een indicatie van het te verwachten dialysaatvolume volgens het volume van elke container. Niet gebruiken na de op de verpakking vermelde vervaldatum. Citraat, een bestanddeel van dit product, kan de behoefte aan heparine verminderen en de concentraties Ca en Mg in het plasma verlagen. Elk ernstig incident dat zich met het product heeft voorgedaan, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt gevestigd is. Verwijder het product volgens de plaatselijke en nationale voorschriften.

PT: CONCENTRADO ÁCIDO PARA HEMODIÁLISE

Importante: Armazenar a uma temperatura não inferior a 4 °C. Produto sem pirogénios. Utilização única. **Utilização prevista:** Preparação da solução de diálise utilizada na hemodiálise e terapêuticas relacionadas. **Indicação:** Tratamento de doentes com insuficiência renal aguda ou crónica quando a hemodiálise é prescrita por um médico. **Benefícios clínicos:** Facilitar a remoção de toxinas úrémicas do sangue que conseguem atravessar a membrana de diálise e equilibrar o desequilíbrio eletrolítico. **Contraindicações:** Não há contraindicações específicas para a utilização do Nipro-sol Citrasate. Este produto não deve ser utilizado na diálise em doentes com hipersensibilidade a qualquer componentes utilizados no Nipro-sol Citrasate. **Efeitos secundários:** Não há registo de efeitos secundários com a utilização do Nipro-sol Citrasate **Instruções:** Concentrado ácido com diluição 1:44 a utilizar em combinação com concentrado de bicarbonato em pó e equipamentos de hemodiálise. Ligação a efetuar ao conetor de concentrado ácido, de acordo com as instruções do fabricante do equipamento. A diluição tem por base a seguinte proporção: Consultar a etiqueta do produto; B é o concentrado de bicarbonato e H20 água desionizada, em conformidade com EP, ISO 23500-5 e aplicável aos requisitos de qualidade locais. **Avisos:** O produto destina-se a ser utilizado por profissionais de saúde. Com exceção de diálise ao domicílio. Para utilizar mediante indicação médica. Garantir que a composição corresponde à prescrição do médico. Não utilizar se a embalagem estiver danificada. A solução concentrada tem de ser imediatamente diluída antes da utilização. Qualquer quantidade de solução não utilizada tem de ser eliminada uma vez que não é possível garantir as suas propriedades nem a composição da mistura final. Consequentemente, não é possível assegurar um tratamento adequado para o doente. Consulte a tabela para uma indicação dos minutos de hemodiálise para fluxos de solução de diálise padrão, de acordo com o volume do recipiente. Consultar a tabela abaixo para uma indicação do volume da solução de diálise previsto, obtido de cada volume do recipiente. Não utilizar após a data de validade indicada na embalagem. O citrato, um componente deste medicamento, pode reduzir a necessidade de heparina e baixar as concentrações de Ca e Mg. Qualquer incidente grave decorrente da utilização do medicamento deve ser notificado ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde residem o utilizador e/ou doente. Eliminar o medicamento em conformidade com os regulamentos locais e nacionais.

SR: KISELI KONCENTRAT ZA HEMODIJALIZU

Važno: Čuvati na temperaturi koja nije niža od 4°C. Apirogeno proizvod. Samo za jednokratnu upotrebu. **Predviđena namena:** Priprema tečnosti za dijalizu koja se koristi u hemodijalizi i srodnim terapijama. **Indikacija:** Terapija pacijenata sa akutnim ili hroničnom bubrežnom insuficijencijom kada hemodijalizu propisuje lekar. **Klinčke koristi:** Olakšava uklanjanje iz krvi uremijskih toksina koji mogu da prođu kroz dijaliznu membranu i uspostavljanje ravnoteže elektrolita. **Kontraindikacije:** Ne postoje posebne kontraindikacije za upotrebu sredstva Nipro-sol Citrasate. Dijalizu ovim proizvodom ne treba vršiti kod pacijenata preosetljivih na bilo koju komponentu korišćenu u sredstvu Nipro-sol Citrasate. **Neželjena dejstva:** Nema prijavljenih neželjenih dejstava za Nipro-sol Citrasate **Uputstva:** Koncentrovani kiseli rastvor u omjeru 1:44 se koristiti zajedno sa koncentrovanim rastvorom bikarbonata u prahu i aparatima za hemodijalizu. Povezuje se sa konektorom za koncentrovani kiseli rastvor, prema uputstvu koje je dao proizvođač mašine. Razblaživanje se zasniva na sledećem odnosu: Pogledajte etiketu proizvoda; B označava koncentrat bikarbonata, a H20 dejonizovanu vodu, što je u skladu sa EP, ISO 23500-5 i važećim lokalnim uslovima koji se tiču kvaliteta. **Upozorenja:** Namenjeno za upotrebu od strane zdravstvenih radnika. Kučna dijaliza je isključena. Koristiti isključivo po nalogu lekara. Uverite se da sastav odgovara onome što je propisao lekar. Ne upotrebljavati ako je pakovanje oštećeno. Koncentrovani rastvor mora se razblaživati neposredno pre upotrebe. Sav neiskorišćen rastvor se mora odložiti u otpad, jer nije moguće garantovati njegova svojstva, kao ni zapreminu konačne mešavine, pa samim tim nije moguće garantovati primenu tretmana koji je najbolji za pacijenta. U tabeli ispod potražite vrednosti trajanja hemodijalize u minutama za standardne protoke tečnosti za dijalizu prema zapremini posude. U tabeli ispod potražite očekivane vrednosti zapremine dijalizne tečnosti dobijene iz posude određene zapremine. Nemojte koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Citrat, komponenta ovog proizvoda, može smanjiti potrebu za heparinom i smanjiti koncentracije Ca i Mg u plazmi. Svaki ozbiljni incident koji se dogodio u vezi sa proizvodom mora se prijaviti proizvođaču i nadležnom telu članice u kojoj je sedište korisnika, odn. boravište pacijenta. Proizvod odložite na otpad u skladu sa lokalnim i državnim propisima.

Size	Dilution factor	Dialysis fluid volume
3.5L	1:44	157.5L
3.9L	1:44	175.5L
5L	1:44	225L

MM-4203 - NiproSolC Citrasate - 24 Jun 2024

NIPRO

NIPROSOL CITRASATE™

MD

CE 2797

UK CA 0086

NIPRO RENAL SOLUTIONS SPAIN S.L.U.
Pol. Ind. Tumsa, Nave nº 31,
E-25230 Mollerussa, Lleida, Spain